【血液内科】

適用	レジメン名称	薬剤名称	商品名	投与量	投与経路	投与日	1コースの期間
リンパ腫	A-AVD	ドキソルビシン	ドキソルビシン注	25 mg/m^2	静注	day1,15	28日間
		ビンブラスチン	エクザール注	6 mg/m^2	静注	day1,15	
		ダカルバジン	ダカルバジン注	375 mg/m^2	点滴静注	day1,15	
		ブレンツキシマブベドチン	アドセトリス注	1.2 mg/kg	点滴静注	day1,15	
リンパ腫	A-CHP	ブレンツキシマブベドチン	アドセトリス注	1.8 mg/kg	点滴静注	day1(max 180mg/body)	21日間
		シクロホスファミド	エンドキサン注	750 mg/m^2	点滴静注	day1	
		ドキソルビシン	ドキソルビシン注	50 mg/m^2	静注	day1	
		プレドニゾロン	プレドニン錠・プレドニゾロン錠・水溶性プレドニン注	100 mg/body	経口 or 点滴静注	day1-5	
リンパ腫	ABV d	ドキソルビシン	ドキソルビシン注	25 mg/m^2	静注	day1,15	28日間
		ブレオマイシン	ブレオ注	9 mg/m^2	点滴静注	day1,15 (max 15mg/body)	
		ビンブラスチン	エクザール注	6 mg/m^2	静注	day1,15	
		ダカルバジン	ダカルバジン注	250 mg/m^2	点滴静注	day1,15	
リンパ腫	CHASE	デキサメタゾン	デキサート注	40 mg/body	点滴静注	day1-3	21日間
		シクロホスファミド	エンドキサン注	1200 mg/m^2	点滴静注	day1	
		シタラビン	キロサイド注・N注、シタラビン注	2000 mg/m^2	点滴静注	day2,3	
		エトポシド	エトポシド注	100 mg/m^2	点滴静注	day1-3	
リンパ腫	CHOP	シクロホスファミド	エンドキサン注	750 mg/m^2	点滴静注	day1	21日間
		ドキソルビシン	ドキソルビシン注	50 mg/m^2	静注	day1	
		ビンクリスチン	オンコビン注	1.4 mg/m^2	静注	day1　(max 2mg/body)	
		プレドニゾロン	プレドニン錠・プレドニゾロン錠	100 mg/body	経口	day1-5	
リンパ腫	G-ベンダムスチン	オビヌツズマブ	ガザイバ注	1000 mg/body	点滴静注	1コース目：day1,8,15 2コース目～：day1	28日間
		ベンダムスチン	ベンダムスチン塩酸塩注	90 mg/m^2	点滴静注	1コース目：day2,3 2コース目～：day1,2	
リンパ腫	GCD-(R)	ゲムシタビン	ゲムシタビン注	1000 mg/m^2	点滴静注	day1,8	21日間
		カルボプラチン	カルボプラチン注	5 AUC	点滴静注	day1	
		デキサメタゾン	デカドロン錠	40 mg/body	経口	day1-4	
		リツキシマブ	リツキシマブBS注	375 mg/m^2	点滴静注	day8	
リンパ腫	GCVP	ゲムシタビン	ゲムシタビン注	750 mg/m^2	点滴静注	コース1　day1,8	21日間
				875 mg/m^2		コース2　day1,8	
				1000 mg/m^2		コース3～　day1,8	
		シクロホスファミド	エンドキサン注	750 mg/m^2	点滴静注	day1	
		ビンクリスチン	オンコビン注	1.4 mg/m^2	静注	day1　(max 2mg/body)	
		プレドニゾロン	プレドニン錠・プレドニゾロン錠	100 mg/body	経口	day1-5	

【血液内科】

適用	レジメン名称	薬剤名称	商品名	投与量	投与経路	投与日	1コースの期間
リンパ腫	HD-MTX(地固め療法)	メトトレキサート	メソトレキセート注	8000 mg/m^2	点滴静注	day1	28日間
リンパ腫	HD-MTX(救援療法)	メトトレキサート	メソトレキセート注	8000 mg/m^2	点滴静注	day1	14日間
リンパ腫	HD-MTX4g/m2	メトトレキサート	メソトレキセート注	4000 mg/m^2	点滴静注	day1	14日間
リンパ腫	BR＋Ibrutinib	リツキシマブ	リツキシマブBS注	375 mg/m^2	点滴静注	day1	28日間
		ベンダムスチン	ベンダムスチン塩酸塩注	90 mg/m^2	点滴静注	1サイクル目：day2,3 2サイクル目～：day1,2	
		イブルチニブ	イムブルビカ	560 mg/body	経口	day1-28	
リンパ腫	BR＋Ibrutinib maintenance	リツキシマブ	リツキシマブBS注	375 mg/m^2	点滴静注	day1	56日間
		イブルチニブ	イムブルビカ	560 mg/body	経口	day1-56	
リンパ腫	MINE	イホスファミド	イホマイド注	1330 mg/m^2	点滴静注	day1-3	21日間
		ミトキサントロン	ノバントロン注	8 mg/m^2	静注	day1	
		エトポシド	エトポシド注	65 mg/m^2	点滴静注	day1-3	
リンパ腫	MR-CHOP	メトトレキサート	メソトレキセート注	2000 mg/m^2	点滴静注	day1	21日間
		リツキシマブ	リツキシマブBS注	375 mg/m^2	点滴静注	day1	
		シクロホスファミド	エンドキサン注	750 mg/m^2	点滴静注	day3	
		ドキソルビシン	ドキソルビシン注	50 mg/m^2	静注	day3	
		ビンクリスチン	オンコビン注	1.4 mg/m^2	静注	day3　(max 2mg/body)	
		プレドニゾロン	プレドニン錠・プレドニゾロン錠	100 mg/body	経口	day1-5	
リンパ腫	Pola-BR	リツキシマブ	リツキシマブBS注	375 mg/m^2	点滴静注	day1	21日間
		ポラツズマブベドチン	ポライビー注	1.8 mg/kg	点滴静注	1サイクル目：day2 2サイクル目～：day1	
		ベンダムスチン	ベンダムスチン塩酸塩注	90 mg/m^2	点滴静注	1サイクル目：day2,3 2サイクル目～：day1,2	
リンパ腫	Pola-R-CHP	リツキシマブ	リツキシマブBS注	375 mg/m^2	点滴静注	1～8コース：day1	21日間
		ポラツズマブベドチン	ポライビー注	1.8 mg/kg	点滴静注	1～6コース：day1	
		シクロホスファミド	エンドキサン注	750 mg/m^2	点滴静注	1～6コース：day1	
		ドキソルビシン	ドキソルビシン注	50 mg/m^2	静注	1～6コース：day1	
		プレドニゾロン	プレドニン錠・プレドニゾロン錠・水溶性プレドニン注	100 mg/body	経口 or 点滴静注	1～6コース：day1-5	
リンパ腫	R-BAC500	リツキシマブ	リツキシマブBS注	375 mg/m^2	点滴静注	day1	28日間
		ベンダムスチン	ベンダムスチン塩酸塩注	70 mg/m^2	点滴静注	day2,3	
		シタラビン	キロサイド注・N注、シタラビン注	500 mg/m^2	点滴静注	day2-4	

【血液内科】

適用	レジメン名称	薬剤名称	商品名	投与量	投与経路	投与日	1コースの期間
リンパ腫	R-GCVP	リツキシマブ	リツキシマブBS注	375 mg/m^2	点滴静注	day1	21日間
		ゲムシタビン	ゲムシタビン注	750 mg/m^2	点滴静注	コース1　day1,8	
				875 mg/m^2		コース2　day1,8	
				1000 mg/m^2		コース3～　day1,8	
		シクロホスファミド	エンドキサン注	750 mg/m^2	点滴静注	day1	
		ビンクリスチン	オンコビン注	1.4 mg/m^2	静注	day1　(max 2mg/body)	
		プレドニゾロン	プレドニン錠・プレドニゾロン錠	100 mg/body	経口	day1-5	
リンパ腫	R２	リツキシマブ	リツキシマブBS注	375 mg/m^2	点滴静注	1コース目：day1,8,15,22 2-5コース：day1 6-12コース：無	28日間
		レナリドミド	レブラミドカプセル	20 mg/body	経口	day1-21	
リンパ腫	(R-)THP-COP	シクロホスファミド	エンドキサン注	750 mg/m^2	点滴静注	day1	21日間
		ピラルビシン	テラルビシン注	50 mg/m^2	静注	day1	
		ビンクリスチン	オンコビン注	1.4 mg/m^2	静注	day1　(max 2mg/body)	
		プレドニゾロン	プレドニン錠・プレドニゾロン錠・水溶性プレドニン注	100 mg/body	経口 or 点滴静注	day1-5	
		（リツキシマブ	リツキシマブBS注	375 mg/m^2	点滴静注	day＊(任意の日)　）	
リンパ腫	アドセトリス	ブレンツキシマブベドチン	アドセトリス注	1.8 mg/kg	点滴静注	day1	21日間
リンパ腫	ガザイバ維持	オビヌツズマブ	ガザイバ注	1000 mg/body	点滴静注	day1	2ヶ月間
リンパ腫	ニボルマブ240(2週間)	ニボルマブ	オプジーボ注	240 mg/body	点滴静注	day1	14日間
リンパ腫	ニボルマブ480(4週間)	ニボルマブ	オプジーボ注	480 mg/body	点滴静注	day1	28日間
リンパ腫	キイトルーダ200(3週間)	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	200 mg/body	点滴静注	day1	21日間
リンパ腫	キイトルーダ400(6週間)	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	400 mg/body	点滴静注	day1	42日間
リンパ腫	リツキシマブ単独	リツキシマブ	リツキシマブBS注	375 mg/m^2	点滴静注	day1	7日間
リンパ腫	リツキシマブ–ベンダムスチン	リツキシマブ	リツキシマブBS注	375 mg/m^2	点滴静注	day1	28日間
		ベンダムスチン	ベンダムスチン塩酸塩注	90 mg/m^2	点滴静注	day2,3もしくはday1,2	
多発性骨髄腫	DBd	ダラツムマブ	ダラザレックス注	16 mg/kg	点滴静注	1-3サイクル目：day1,8,15 4サイクル目～：day1	1-8サイクル目：21日間 9サイクル目以降：28日間
		ボルテゾミブ	ボルテゾミブ注	1.3 mg/m^2	皮下注	1-8サイクル目：day1,4,8,11 9サイクル目以降：なし	
		デキサメタゾン	デカドロン錠 デキサート注	20 mg/body	経口 or 点滴静注	1-8サイクル目：day１,2,4,5,８,9,11,12 9サイクル目以降：なし	

【血液内科】

適用	レジメン名称	薬剤名称	商品名	投与量	投与経路	投与日	1コースの期間
多発性骨髄腫	DBd(ダラキューロ)	ダラツムマブ	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	皮下注	1-3サイクル目：day1,8,15 4サイクル目～：day1	1-8サイクル目：21日間 9サイクル目以降：28日間
		ボルテゾミブ	ボルテゾミブ注	1.3 mg/m^2	皮下注	1-8サイクル目：day1,4,8,11 9サイクル目以降：なし	
		デキサメタゾン	デカドロン錠 デキサート注	20 mg/body	経口 or 点滴静注	1-8サイクル目：day１,2,4,5,８,9,11,12 9サイクル目以降：なし	
多発性骨髄腫	DKD	ダラツムマブ	ダラザレックス注	8 mg/kg	点滴静注	1サイクル目：day1,2	28日間
				16 mg/kg		1サイクル目：day8,15,22 2サイクル目：day1,8,15,22 3-6サイクル目：day1,15 7サイクル目～：day1	
		カルフィルゾミブ	カイプロリス注	20 mg/m2	点滴静注	1サイクル目：day1,2	
				56 mg/m2		1サイクル目：day8,9,15,16 2サイクル目：day1,2,8,9,15,16	
		デキサメタゾン	デカドロン錠	40 mg/body	経口	day１,2,８,9,15,16,22 (76歳以上20mg/body)	
多発性骨髄腫	DKD(ダラキューロ)	ダラツムマブ	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	皮下注	1-2サイクル目：day1,8,15,22 3-6サイクル目：day1,15 7サイクル目～：day1	28日間
		カルフィルゾミブ	カイプロリス注	20 mg/m2	点滴静注	1サイクル目：day1,2	
				56 mg/m2		1サイクル目：day8,9,15,16 2サイクル目：day1,2,8,9,15,16	
		デキサメタゾン	デカドロン錠	40 mg/body	経口	day１,2,８,9,15,16,22 (76歳以上20mg/body)	
多発性骨髄腫	DMPB	ダラツムマブ	ダラザレックス注	16 mg/kg	点滴静注	1サイクル目：day1,8,15,22,29,36 2-9サイクル目：day1,22 10サイクル目～：day1	1-9サイクル目：42日間 10サイクル目以降：28日間
		ボルテゾミブ	ボルテゾミブ注	1.3 mg/m^2	皮下注	1サイクル目：day1,4,8,11,22,25,29,32 2-9サイクル目：day1,8,22,29 10サイクル目以降：なし	
		メルファラン	アルケラン錠	9 mg/m^2	経口	1-9サイクル目：day1-4 10サイクル目以降：なし	
		プレドニゾロン	プレドニン錠・プレドニゾロン錠	60 mg/m^2	経口	1-9サイクル目：day2-4 10サイクル目以降：なし	

適用	レジメン名称	薬剤名称	商品名	投与量	投与経路	投与日	1コースの期間
多発性骨髄腫	DMPB(ダラキューロ)	ダラツムマブ	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	皮下注	1サイクル目：day1,8,15,22,29,36 2-9サイクル目：day1,22 10サイクル目～：day1	1-9サイクル目：42日間 10サイクル目以降：28日間
		ボルテゾミブ	ボルテゾミブ注	1.3 mg/m^2	皮下注	1サイクル目：day1,4,8,11,22,25,29,32 2-9サイクル目：day1,8,22,29 10サイクル目以降：なし	
		メルファラン	アルケラン錠	9 mg/m^2	経口	1-9サイクル目：day1-4 10サイクル目以降：なし	
		プレドニゾロン	プレドニン錠・プレドニゾロン錠	60 mg/m^2	経口	1-9サイクル目：day2-4 10サイクル目以降：なし	
多発性骨髄腫	DPd(ダラキューロ)	ダラツムマブ	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	皮下注	1-2サイクル目：day1,8,15,22 3-6サイクル目：day1,15 7サイクル目～：day1	28日間
		ポマリドミド	ポマリストカプセル	4 mg/body	経口	day1-21	
		デキサメタゾン	デカドロン錠・デキサート注 (75歳未満)	40 mg/body/週	経口 or 点滴静注	1-2サイクル目：day1,2,8,915,16,22,23 3-6サイクル目：day1,2,8,15,16,22 7サイクル目～：day1,2,8,15,22	
			(75歳以上)	20 mg/body		day1,8,15,22	
多発性骨髄腫	DRd	ダラツムマブ	ダラザレックス注	16 mg/kg	点滴静注	1-2サイクル目：day1,8,15,22 3-6サイクル目：day1,15 7サイクル目～：day1	28日間
		レナリドミド	レブラミドカプセル	25 mg/body	経口	day1-21	
		デキサメタゾン	デカドロン錠	40 mg/body	経口	day1,8,15,22	
多発性骨髄腫	DRd(ダラキューロ)	ダラツムマブ	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	皮下注	1-2サイクル目：day1,8,15,22 3-6サイクル目：day1,15 7サイクル目～：day1	28日間
		レナリドミド	レブラミドカプセル	25 mg/body	経口	day1-21	
		デキサメタゾン	デカドロン錠・デキサート注	40 mg/body	経口 or 点滴静注	day1,8,15,22	
多発性骨髄腫	E-Ld	レナリドミド	レブラミドカプセル	25 mg/body	経口	day1-21	28日間
		エロツズマブ	エムプリシティ注	10 mg/kg	点滴静注	1,2サイクル目：day1,8,15,22 3サイクル目以降：day1,15	

【血液内科】

適用	レジメン名称	薬剤名称	商品名	投与量	投与経路	投与日	1コースの期間
多発性骨髄腫	EPD	ポマリドミド	ポマリストカプセル	4 mg/body	経口	day1-21	28日間
		エロツズマブ	エムプリシティ注	10 mg/kg	点滴静注	1-2サイクル　day１,８,15,22 3サイクル目以降　day１	
				20 mg/kg			
		デキサメタゾン	デカドロン錠	40 mg/body	経口	day１,８,15,22 (76歳以上20mg/body)	
多発性骨髄腫	Isa-KD	イサツキシマブ	サークリサ注	10 mg/kg	点滴静注	1サイクル目：day1,8,15,22 2サイクル目～：day1,15	28日間
		カルフィルゾミブ	カイプロリス注	20 mg/m2	点滴静注	1サイクル目：day1,2	
				56 mg/m2		1サイクル目：day8,9,15,16 2サイクル目：day1,2,8,9,15,16	
		デキサメタゾン	デカドロン錠	20 mg/body	経口	day１,2,８,9,15,16,22,23	
多発性骨髄腫	Isa-PD	イサツキシマブ	サークリサ注	10 mg/kg	点滴静注	1サイクル目：day1,8,15,22 2サイクル目～：day1,15	28日間
		ポマリドミド	ポマリストカプセル	4 mg/body	経口	day1-21	
		デキサメタゾン	デカドロン錠	40 mg/body	経口	day１,８,15,22 (76歳以上20mg/body)	
多発性骨髄腫	Isa-VRD	イサツキシマブ	サークリサ注	10 mg/kg	点滴静注	1サイクル目：day1,8,15,22,29 2-4サイクル目：day1,15,29 5-17サイクル目：day1,15 18サイクル目：day1	1-4サイクル：42日間 5-18サイクル：28日間
		ボルテゾミブ	ボルテゾミブ注	1.3 mg/m^2	皮下注	1-4サイクル目：day1,4,8,11,22,25,29,32	
		レナリドミド	レブラミドカプセル	25 mg/body	経口	1-4サイクル目：day1-14,22-35 5-18サイクル目：day1-21	
		デキサメタゾン	デカドロン錠 デキサート注	20 mg/body	経口 or 点滴静注	1-4サイクル目： day 1,2,4,5,8,9,11,12,15, 22,23,25,26, 29,30,32,33 5-18サイクル目：day1,8,15,22	
多発性骨髄腫	KMP	カルフィルゾミブ	カイプロリス注	20 mg/m2	点滴静注	1サイクル目：day1,2	42日間
				36 mg/m2		1サイクル目：day8,9,22,23,29,30 2サイクル目：day1,2,8,9,22,23,29,30	
		デキサメタゾン	デカドロン注	4 mg/body	点滴静注	1サイクル目のみ：day8,9,22,23,29,30	
		メルファラン	アルケラン錠	9 mg/m^2	経口	day1-4	
		プレドニゾロン	プレドニン錠・プレドニゾロン錠	60 mg/m^2	経口	day1-4	

【血液内科】

適用	レジメン名称	薬剤名称	商品名	投与量	投与経路	投与日	1コースの期間
多発性骨髄腫	modified RVD(RVD lite)	レナリドミド	レブラミドカプセル	15 mg/body	経口	day1-21	1-9コース ：35日間
		ボルテゾミブ	ボルテゾミブ注	1.3 mg/m^2	皮下注	day1,8,15,22	
		デキサメタゾン	デカドロン錠	20 mg/body	経口	≦75歳:day1,2,8,9,15,16,22,23 ＞75歳:day1,8,15,22	
		レナリドミド	レブラミドカプセル	15 mg/body	経口	day1-21	10-15ｺｰｽ ：28日間
		ボルテゾミブ	ボルテゾミブ注	1.3 mg/m^2	皮下注	day1,15	
多発性骨髄腫	PD	ポマリドミド	ポマリストカプセル	4 mg/body	経口	day1-21	28日間
		デキサメタゾン	デカドロン錠	40 mg/body	経口	day１,８,15,22 (76歳以上20mg/body)	
多発性骨髄腫	VRd	ボルテゾミブ	ボルテゾミブ注	1.3 mg/m^2	皮下注	day1,4,8,11	21日間
		レナリドミド	レブラミドカプセル	25 mg/body	経口	day1-14	
		デキサメタゾン	デカドロン錠　1-3コース 4コース-	20 mg/body 10 mg/body	経口	day1,2,4,5,8,9,11,12	
多発性骨髄腫	Weekly Kd	カルフィルゾミブ	カイプロリス注	20 mg/m2	点滴静注	1サイクル目：day1	28日間
				70 mg/m2		1サイクル目：day8,15 2サイクル目以降：day1,8,15	
		デキサメタゾン	デカドロン錠、デカドロン注	40 mg/body	経口 or 点滴静注	day1,8,15,22	
多発性骨髄腫	ベルケイド（21日間）	ボルテゾミブ	ボルテゾミブ注	1.3 mg/m^2	皮下注または静注	day1,4,8,11	21日間
		デキサメタゾン	デカドロン錠	20 mg/body	経口	day1,2,4,5,8,9,11,12	
多発性骨髄腫	ベルケイド（35日間）	ボルテゾミブ	ボルテゾミブ注	1.3 mg/m^2	皮下注または静注	day1,8,15,22	35日間
		デキサメタゾン	デカドロン錠	20 mg/body	経口	day1,2,8,9,15,16,22,23	
骨髄異形成症候群	ビダーザ	アザシチジン	ビダーザ注	75 mg/m^2	皮下注または静注	day1-7	28日間
急性骨髄性白血病	未治療FLT3陽性AML寛解導入	イダルビシン	イダマイシン注	12 mg/m^2	点滴静注	day1-3	
		シタラビン	キロサイド注・N注、シタラビン注	100 mg/m^2	点滴静注	day1-7	
		キザルチニブ	ヴァンフリタ錠	35.4 mg/body	経口	day8-21	
急性骨髄性白血病	未治療FLT3陽性AML地固め	シタラビン	キロサイド注・N注、シタラビン注	3000 mg/m^2 ×2回	点滴静注	day1,3,5 (60歳-：1500mg/m^2)	28日間
		キザルチニブ	ヴァンフリタ錠	35.4 mg/body	経口	day6-19	
急性骨髄性白血病	AML(JALSG97 地固め①)	ミトキサントロン	ノバントロン注	7 mg/m^2	点滴静注	day1-3	28日間
		シタラビン	キロサイド注・N注、シタラビン注	200 mg/m^2	点滴静注	day1-5	
急性骨髄性白血病	AML(JALSG97 地固め②)	ダウノルビシン	ダウノマイシン注	50 mg/m^2	点滴静注	day1-3	28日間
		シタラビン	キロサイド注・N注、シタラビン注	200 mg/m^2	点滴静注	day1-5	
急性骨髄性白血病	AML(JALSG97 地固め③)	アクラルビシン	アクラシノン注	20 mg/m^2	点滴静注	day1-5	28日間
		シタラビン	キロサイド注・N注、シタラビン注	200 mg/m^2	点滴静注	day1-5	

【血液内科】

適用	レジメン名称	薬剤名称	商品名	投与量	投与経路	投与日	1コースの期間
急性骨髄性白血病	CA(G)	アクラルビシン	アクラシノン注	14 mg/m^2	点滴静注	day1-4	28日間
		シタラビン	キロサイド注・N注、シタラビン注	10 mg/m^2	皮下注	day1夕- day15朝　1日2回	
急性骨髄性白血病	GO(6+3)	ゲムツズマブオゾガマイシン	マイロターグ注	6 mg/m^2	点滴静注	day1	
				3 mg/m^2	点滴静注	day8	
急性骨髄性白血病	IDR+Ara-C	イダルビシン	イダマイシン注	12 mg/m^2	点滴静注	day1-3	(寛解確認後地固め療法に移行)
		シタラビン	キロサイド注・N注、シタラビン注	100 mg/m^2	点滴静注	day1-7	
急性骨髄性白血病	Ven+AraC	シタラビン	キロサイド注・N注、シタラビン注	20 mg/m^2	皮下注	day1-10	28日間
		ベネトクラクス	ベネクレクスタ錠	100 mg/body	経口	1サイクル目　day1	
				200 mg/body	経口	1サイクル目　day2	
				400 mg/body	経口	1サイクル目　day3	
				600 mg/body	経口	1サイクル目　day4-day28 2サイクル目以降　day1-day28	
急性骨髄性白血病	Ven+AZA	アザシチジン	ビダーザ注	75 mg/m^2	皮下注または静注	day1-7	28日間
		ベネトクラクス	ベネクレクスタ錠	100 mg/body	経口	1サイクル目　day1	
				200 mg/body	経口	1サイクル目　day2	
				400 mg/body	経口	1サイクル目　day3-day28 2サイクル目以降　day1-day28	
急性骨髄性白血病	ビキセオス（寛解導入）	ダウノルビシン・シタラビン	ビキセオス配合注	100 単位/m^2	点滴静注	day1,3,5	14-35日間(地固めに移行の場合35-56日間)
急性骨髄性白血病	ビキセオス（寛解導入2回目）	ダウノルビシン・シタラビン	ビキセオス配合注	100 単位/m^2	点滴静注	day1,3	35-56日間
急性骨髄性白血病	ビキセオス（地固め）	ダウノルビシン・シタラビン	ビキセオス配合注	65 単位/m^2	点滴静注	day1,3	35-56日間
急性前骨髄性白血病	APML4（寛解導入）	トレチノイン	ベサノイドカプセル	45 mg/m^2	経口（分２）	day1-36	36日間
		イダルビシン	イダマイシン注	12 mg/m^2	静注	day2,4,6,8 (61-70歳：9mg/m^2 71歳-：6mg/m^2)	
		三酸化二ヒ素	トリセノックス注	0.15 mg/kg	点滴静注	day9-36	
急性前骨髄性白血病	APML4　地固め①	トレチノイン	ベサノイドカプセル	45 mg/m^2	経口（分２）	day1-28	28日間
		三酸化二ヒ素	トリセノックス注	0.15 mg/kg	点滴静注	day1-28	
急性前骨髄性白血病	APML4　地固め②	トレチノイン	ベサノイドカプセル	45 mg/m^2	経口（分２）	day1-7, 15-21, 29-35	35日間
		三酸化二ヒ素	トリセノックス注	0.15 mg/kg	点滴静注	day1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 29-33	

【血液内科】

適用	レジメン名称	薬剤名称	商品名	投与量	投与経路	投与日	1コースの期間
急性リンパ性白血病	ブリナツモマブ	ブリナツモマブ	ビーリンサイト注	9 μg/body	点滴静注	1サイクル目：day1-7	1-5サイクル目：42日間 6-9サイクル目：84日間
				28 μg/body	点滴静注	1-5サイクル目：day8-28 6-9サイクル目：day1-28	
急性リンパ性白血病	ブリナツモマブ+ポナチニブ	ブリナツモマブ	ビーリンサイト注	9 μg/body	点滴静注	1サイクル目：day1-7	42日間
				28 μg/body	点滴静注	1サイクル目：day8-28 2サイクル目～：day1-28	
		ポナチニブ	アイクルシグ錠	30-45 mg/body	経口	day1-42	
急性リンパ性白血病	Hyper CVAD/MA(odd course1,3,5,7)	シクロホスファミド	エンドキサン注	300 mg/m^2 ×2回	点滴静注	day1-3	
		ビンクリスチン	オンコビン注	1.4 mg/m^2	点滴静注	day4,11　(max 2mg/body)	
		ドキソルビシン	ドキソルビシン注	50 mg/m^2	点滴静注	day4	
		デキサメタゾン	デキサート注	40 mg/body	点滴静注	day1-4,11-14	
		メトトレキサート	メソトレキセート注	12 mg/body	髄注(IT)	day2	
		プレドニゾロン	水溶性プレドニン注	10 mg/body	髄注(IT)	day2	
		シタラビン	キロサイド注・N注、シタラビン注	100 mg/body	髄注(IT)	day8	
		プレドニゾロン	水溶性プレドニン注	10 mg/body	髄注(IT)	day8	
急性リンパ性白血病	Hyper CVAD/MA(even course2,4,6,8)	メトトレキサート	メソトレキセート注	1000 mg/m^2	点滴静注	day1	
		シタラビン	キロサイド注・N注、シタラビン注	3000 mg/m^2 ×2回	点滴静注	day2,3 (60歳-：1000mg/m^2)	
		メチルプレドニゾロン	ソル・メドロール注	50 mg/body ×2回	点滴静注	day1-3	
		メトトレキサート	メソトレキセート注	12 mg/body	髄注(IT)	day2	
		プレドニゾロン	水溶性プレドニン注	10 mg/body	髄注(IT)	day2	
		シタラビン	キロサイド注・N注、シタラビン注	100 mg/body	髄注(IT)	day8	
		プレドニゾロン	水溶性プレドニン注	10 mg/body	髄注(IT)	day8	
急性リンパ性白血病	JALSG ALL202-O C1	シタラビン	キロサイド注・N注、シタラビン注	2000 mg/m^2 ×2回	点滴静注	day1-3 (60歳-：1000mg/m^2)	28日間
		エトポシド	エトポシド注	100 mg/m^2	点滴静注	day1-3	
		デキサメタゾン	デキサート注	40 mg/body	点滴静注	day1-3	
急性リンパ性白血病	JALSG ALL202-O C2	メトトレキサート	メソトレキセート注	3000 mg/m^2	点滴静注	day1,15	28日間
		ビンクリスチン	オンコビン注	1.3 mg/m^2	静注	day1,15(max 2mg/body)	
		メトトレキサート	メソトレキセート注	15 mg/body	髄注(IT)	day1,15	
		デキサメタゾン	デキサート注	4 mg/body	髄注(IT)	day1,15	
		6-メルカプトプリン	ロイケリン散	25 mg/m^2	経口	day1-21	

【血液内科】

適用	レジメン名称	薬剤名称	商品名	投与量	投与経路	投与日	1コースの期間
急性リンパ性白血病	JALSG ALL202-O C3	ビンクリスチン	オンコビン注	1.3 mg/m^2	静注	day1,8,15(max 2mg/body)	42日間
		ドキソルビシン	ドキソルビシン注	30 mg/m^2	静注	day1,8,15	
		デキサメタゾン	デカドロン錠	10 mg/m^2	経口	day1-8,15-22	
		シクロホスファミド	エンドキサン注	1000 mg/m^2	点滴静注	day29	
		6-メルカプトプリン	ロイケリン散	60 mg/m^2	経口	day29-42	
		シタラビン	キロサイド注・N注、シタラビン注	75 mg/m^2	点滴静注	day29-33,36-40	
		メトトレキサート	メソトレキセート注	15 mg/body	髄注(IT)	day1,29	
		シタラビン	キロサイド注・N注、シタラビン注	40 mg/body	髄注(IT)	day1,29	
		デキサメタゾン	デキサート注	4 mg/body	髄注(IT)	day1,29	
急性リンパ性白血病	JALSG ALL202-O 維持	ビンクリスチン	オンコビン注	1.3 mg/m^2	静注	day1(max 2mg/body)	28日間
		プレドニゾロン	プレドニン錠・プレドニゾロン錠	60 mg/m^2	経口	day1-5	
		メトトレキサート	メソトレキセート錠	20 mg/m^2	経口	day1,8,15,22	
		6-メルカプトプリン	ロイケリン散	60 mg/m^2	経口	day1-28	
急性リンパ性白血病	JALSG Ph+ALL213強化地固め療法	シクロホスファミド	エンドキサン注	1200 mg/m^2	点滴静注	day1	38日間
		ダウノルビシン	ダウノマイシン注	45 mg/m^2	点滴静注	day1-3	
		ビンクリスチン	オンコビン注	1.3 mg/m^2	静注	day1,8,15,22　(max 2mg/body)	
		プレドニゾロン	プレドニン錠・プレドニゾロン錠	60 mg/m^2	経口	day1-21＆漸減	
		ダサチニブ	スプリセル錠	100 mg/body	経口	day4-31	
		メトトレキサート	メソトレキセート注	15 mg/body	髄注(IT)	day1	
		デキサメタゾン	デキサート注	4 mg/body	髄注(IT)	day1	
急性リンパ性白血病	JALSG Ph+ALL213地固め療法C1	メトトレキサート	メソトレキセート注	1000 mg/m^2	点滴静注	day1	31日間
		シタラビン	キロサイド注・N注、シタラビン注	2000 mg/m^2 ×2回	点滴静注	day2-3	
		メチルプレドニゾロン	ソルメドロール注	50 mg/body×2回	点滴静注	day1-3	
		ダサチニブ	スプリセル錠	100 mg/body	経口	day4-24	
		メトトレキサート	メソトレキセート注	15 mg/body	髄注(IT)	day1	
		デキサメタゾン	デキサート注	4 mg/body	髄注(IT)	day1	
急性リンパ性白血病	JALSG Ph+ALL213地固め療法C2	シクロホスファミド	エンドキサン注	1200 mg/m^2	点滴静注	day1	29日間
		ダウノルビシン	ダウノマイシン注	45 mg/m^2	点滴静注	day1	
		ビンクリスチン	オンコビン注	1.3 mg/m^2	静注	day1　(max 2mg/body)	
		プレドニゾロン	プレドニン錠・プレドニゾロン錠	60 mg/m^2	経口	day1-7＆漸減	
		ダサチニブ	スプリセル錠	100 mg/body	経口	day2 -22	
		メトトレキサート	メソトレキセート注	15 mg/body	髄注(IT)	day1	
		デキサメタゾン	デキサート注	4 mg/body	髄注(IT)	day1	

【血液内科】

適用	レジメン名称	薬剤名称	商品名	投与量	投与経路	投与日	1コースの期間
急性リンパ性白血病	JALSG Ph+ALL213維持	ビンクリスチン	オンコビン注	1.3 mg/m^2	静注	day1　(max 2mg/body)	35日間
		プレドニゾロン	プレドニン錠・プレドニゾロン錠	60 mg/m^2	経口	day1-7＆漸減	
		ダサチニブ	スプリセル錠	100 mg/body	経口	day1-28	
急性リンパ性白血病	JALSG Ph(-)B-ALL213 C1、C4	シタラビン	キロサイド注・N注、シタラビン注	2000 mg/m^2 ×2回	点滴静注	day1-3 (60-64歳：1000mg/m^2×2回)	
		エトポシド	エトポシド注	100 mg/m^2	点滴静注	day1-3	
		デキサメタゾン	デキサート注	40 mg/body	点滴静注	day1-3	
		L-アスパラギナーゼ	ロイナーゼ注	10000 K単位/m^2	点滴静注または筋注	day４ (60-64歳：5000K単位/m^2)	
		メトトレキサート	メソトレキセート注	15 mg/body	髄注(IT)	day1	
		シタラビン	キロサイド注・N注、シタラビン注	40 mg/body	髄注(IT)	day1	
		デキサメタゾン	デキサート注	4 mg/body	髄注(IT)	day1	
急性リンパ性白血病	JALSG Ph(-)B-ALL213 C2、C5	メトトレキサート	メソトレキセート注	3000 mg/m^2	点滴静注	day1,15　(50-64歳　1500mg/m^2)	
		ビンクリスチン	オンコビン注	1.3 mg/m^2	静注	day1,15　(max 2mg/body)	
		6-メルカプトプリン	ロイケリン散	25 mg/m^2	経口	day1-21	
		L-アスパラギナーゼ	ロイナーゼ注	10000 K単位/m^2	点滴静注または筋注	day3,17 (60-64歳：5000K単位/m^2)	
		メトトレキサート	メソトレキセート注	15 mg/body	髄注(IT)	day1,15	
		シタラビン	キロサイド注・N注、シタラビン注	40 mg/body	髄注(IT)	day1,15	
		デキサメタゾン	デキサート注	4 mg/body	髄注(IT)	day1,15	
急性リンパ性白血病	JALSG Ph(-)B-ALL213 C3	ビンクリスチン	オンコビン注	1.3 mg/m^2	静注	day1,8,15　(max 2mg/body)	
		ダウノルビシン	ダウノマイシン注	45 mg/m^2	点滴静注	day1,8,15(60-64歳：30mg/m2)	
		デキサメタゾン	デキサート注	10 mg/m^2	経口	day1-8,15-22	
		シクロホスファミド	エンドキサン注	1200 mg/m^2	点滴静注	day29(60-64歳：800mg/m2)	
		6-メルカプトプリン	ロイケリン散	60 mg/m^2	経口	day29-42	
		シタラビン	キロサイド注・N注、シタラビン注	75 mg/m^2	点滴静注	day29-33,36-40	
		L-アスパラギナーゼ	ロイナーゼ注	5000 K単位/m^2	点滴静注または筋注	day2,4,6,9,11,13 (60-64歳：3000K単位/m^2)	
		メトトレキサート	メソトレキセート注	15 mg/body	髄注(IT)	day1,29	
		シタラビン	キロサイド注・N注、シタラビン注	40 mg/body	髄注(IT)	day1,29	
		デキサメタゾン	デキサート注	4 mg/body	髄注(IT)	day1,29	

【血液内科】

適用	レジメン名称	薬剤名称	商品名	投与量	投与経路	投与日	1コースの期間
慢性リンパ性白血病	VenR	ベネトクラクス	ベネクレクスタ錠	20 mg/body	経口	用量漸増期　day1-7	用量漸増期 ：35日間 1クール目～ ：28日間
				50 mg/body	経口	用量漸増期　day8-14	
				100 mg/body	経口	用量漸増期　day15-21	
				200 mg/body	経口	用量漸増期　day22-28	
				400 mg/body	経口	用量漸増期　day29-35 1サイクル目～	
		リツキシマブ	リツキサン注	375 mg/m^2	経口	1サイクル目　day1	
				500 mg/m^2	経口	2-6サイクル目　day1	
慢性リンパ性白血病 リンパ腫	アカラブルチニブ＋オビヌツズマブ	アカラブルチニブ	カルケンスカプセル	200 mg/body	経口	day1 -28	28日間
		オビヌツズマブ	ガザイバ注	100 mg/body	点滴静注	2サイクル目　day 1	
				900 mg/body	点滴静注	2サイクル目　day2	
				1000 mg/body	点滴静注	2サイクル目　day8,15 3～7サイクル目　day1	
リンパ腫 急性白血病	髄注	メトトレキサート	メソトレキセート注	15 mg/body	髄注(IT)		
		シタラビン	キロサイド注・N注、シタラビン注	40 mg/body	髄注(IT)		
		プレドニゾロン	水溶性プレドニン注	10 mg/body	髄注(IT)		