【外科（消化器外科、乳腺外科）】

適用	レジメン名称	薬剤名称	商品名	投与量	投与経路	投与日	１コースの期間
食道	CDDP+VP-16	シスプラチン	シスプラチン注	80 mg/m2	点滴静注	day1	28日間
		エトポシド	エトポシド注	100 mg/m2	点滴静注	day1-3	
食道	CDGP＋5-FU	ネダプラチン	アクプラ注	90 mg/m2	点滴静注	day1	28日間
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	800 mg/m2	点滴静注	day1-5	
食道	weekly PTX*	パクリタキセル	パクリタキセル注	100 mg/m2	点滴静注	day1,8,15,22,29,36	49日間
食道	DCF(ドセタキセル非分割投与)	ドセタキセル	ドセタキセル注	70 mg/m2	点滴静注	day1	21日間
		シスプラチン	シスプラチン注	70 mg/m2	点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	700 mg/m2	点滴静注	day1-5	
食道	DOC（TXT）*	ドセタキセル	ドセタキセル注	70 mg/m2	点滴静注	day1	21日間
食道	DOC＋放射線照射	ドセタキセル	ドセタキセル注	10 mg/m2	点滴静注	day1	７日間
食道	FP＋キイトルーダ	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	200 mg/body	点滴静注	day1	21日間
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	800 mg/m2	点滴静注	day1-5	
		シスプラチン	シスプラチン注	80 mg/m2	点滴静注	day1	
食道	FP＋ニボルマブ(2週間)	ニボルマブ	オプジーボ注	240 mg/body	点滴静注	day1,15	28日間
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	800 mg/m2	点滴静注	day1-5	
		シスプラチン	シスプラチン注	80 mg/m2	点滴静注	day1	
食道	FP＋ニボルマブ(4週間)	ニボルマブ	オプジーボ注	480 mg/body	点滴静注	day1	28日間
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	800 mg/m2	点滴静注	day1-5	
		シスプラチン	シスプラチン注	80 mg/m2	点滴静注	day1	
食道	ニボルマブ+イピリムマブ（２週間）	ニボルマブ	オプジーボ注	240 mg/body	点滴静注	day1,15,29	42日間
		イピリムマブ	ヤーボイ注	1 mg/kg	点滴静注	day1	
食道	ニボルマブ+イピリムマブ（３週間）	ニボルマブ	オプジーボ注	360 mg/body	点滴静注	day1,22	42日間
		イピリムマブ	ヤーボイ注	1 mg/kg	点滴静注	day1	
食道	パクリタキセル+TS-1	パクリタキセル	パクリタキセル注	100 mg/m2	点滴静注	day1,8	21日間
		S-1	エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/m2	経口	day1-14	
食道･胃	FP	フルオロウラシル	フルオロウラシル注	800 mg/m2	点滴静注	day1-5	28日間
		シスプラチン	シスプラチン注	80 mg/m2	点滴静注	day1	
食道･胃	オプジーボ240(2週間)*	ニボルマブ	オプジーボ注	240 mg/body	点滴静注	day1	14日間
食道･胃	オプジーボ480(4週間)*	ニボルマブ	オプジーボ注	480 mg/body	点滴静注	day1	28日間
胃・十二指腸	G-ＳＯＸ	オキサリプラチン	オキサリプラチン注	100 mg/m2	点滴静注	day1	21日間
		S-1	エスワンタイホウ配合OD錠	80-120 mg/body	経口	day1-14	
胃	CPT-11 biweekly	イリノテカン	イリノテカン注	150 mg/m2	点滴静注	day1	14日間

適用	レジメン名称	薬剤名称	商品名	投与量	投与経路	投与日	1コースの期間
胃	TS-1+CDDP	シスプラチン	シスプラチン注	60 mg/m2	点滴静注	day8	35日間
		S-1	エスワンタイホウ配合OD錠	80-120 mg/body	経口	day1-21	
胃	TS-1+DOC	ドセタキセル	ドセタキセル注	40 mg/m2	点滴静注	day1	21日間
		S-1	エスワンタイホウ配合OD錠	80-120 mg/body	経口	day1-14	
胃	アブラキサン(nab-PTX)	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	アブラキサン注	260 mg/m2	点滴静注	day1	21日間
胃	キイトルーダ＋CAPOX	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	200 mg/body	点滴静注	day1	21日間
		オキサリプラチン	オキサリプラチン注	130 mg/m2	点滴静注	day1	
		カペシタビン	カペシタビン錠	2000 mg/m2	経口	day1-14	
胃	キイトルーダ+SOX	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	200 mg/body	点滴静注	day1	21日間
		オキサリプラチン	オキサリプラチン注	130 mg/m2	点滴静注	day1	
		S-1	エスワンタイホウ配合OD錠	80-120 mg/body	経口	day1-14	
胃	キイトルーダ＋SP	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	200 mg/body	点滴静注	day1	21日間
		シスプラチン	シスプラチン注	60 mg/m2	点滴静注	day1	
		S-1	エスワンタイホウ配合OD錠	80-120 mg/body	経口	day1-14	
胃	サイラムザ+nabPTX	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	アブラキサン注	100 mg/m2	点滴静注	day1,8,15	28日間
		ラムシルマブ	サイラムザ注	8 mg/kg	点滴静注	day1,15	
胃	サイラムザ+パクリタキセル	ラムシルマブ	サイラムザ注	8 mg/kg	点滴静注	day1,15	28日間
		パクリタキセル	パクリタキセル注	80 mg/m2	点滴静注	day1,8,15	
胃	ニボルマブ＋CapeOX	ニボルマブ	オプジーボ注	360 mg/body	点滴静注	day1	21日間
		オキサリプラチン	オキサリプラチン注	130 mg/m2	点滴静注	day1	
		カペシタビン	カペシタビン錠	2000 mg/m2	経口	day1-14	
胃	ニボルマブ+FOLFOX	ニボルマブ	オプジーボ注	240 mg/body	点滴静注	day1	14日間
		オキサリプラチン	オキサリプラチン注	85 mg/m2	点滴静注	day1	
		レボホリナート	レボホリナート注	200 mg/m2	点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	400 mg/m2	急速点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	2400 mg/m2	点滴静注	day1(46H)	
胃	ニボルマブ+SOX	ニボルマブ	オプジーボ注	360 mg/body	点滴静注	day1	21日間
		オキサリプラチン	オキサリプラチン注	130 mg/m2	点滴静注	day1	
		S-1	エスワンタイホウ配合OD錠	80-120 mg/body	経口	day1-14	
胃	パクリタキセル単独	パクリタキセル	パクリタキセル注	80 mg/m2	点滴静注	day1,8,15	28日間

適用	レジメン名称	薬剤名称	商品名	投与量	投与経路	投与日	1コースの期間
胃	ハーセプチン+エルプラット＋ゼローダ	トラスツズマブ　（初回）	ハーセプチン注	8 mg/kg	点滴静注	day1	21日間
		（2回目以降）		6 mg/kg			
		オキサリプラチン	オキサリプラチン注	130 mg/m2	点滴静注	day1	
		カペシタビン	カペシタビン錠	2000 mg/m2	経口	day1夕-day15朝	
胃	ビロイ＋CAPOX	ゾルベツキシマブ（初回）	ビロイ注	800 mg/m2	点滴静注	day1	21日間
		（2回目以降）		600 mg/m2			
		オキサリプラチン	オキサリプラチン注	130 mg/m2	点滴静注	day1（最大８クール）	
		カペシタビン	カペシタビン錠	2000 mg/m2	経口	day1夕-day15朝	
胃	ビロイ＋mFOLFOX6(2週間)	ゾルベツキシマブ（初回）	ビロイ注	800 mg/m2	点滴静注	day1	14日間
		（2回目以降）		400 mg/m2			
		オキサリプラチン	オキサリプラチン注	85 mg/m2	点滴静注	day1（最大12クール）	
		レボホリナート	レボホリナート注	200 mg/m2	点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	400 mg/m2	急速点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	2400 mg/m2	点滴静注	day1(46H)	
胃	ビロイ＋mFOLFOX6(3週間)	ゾルベツキシマブ（初回）	ビロイ注	800 mg/m2	点滴静注	day1,22	42日間
		（2回目以降）		600 mg/m2			
		オキサリプラチン	オキサリプラチン注	85 mg/m2	点滴静注	day1,15,29 (最大４クール:12回投与)	
		レボホリナート	レボホリナート注	200 mg/m2	点滴静注	day1,15,29	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	400 mg/m2	急速点滴静注	day1,15,29	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	2400 mg/m2	点滴静注	day1,15,29(46H)	
胃	SP(21日間)+ハーセプチン	トラスツズマブ　（初回）	ハーセプチン注	8 mg/kg	点滴静注	day1	21日間
		（2回目以降）		6 mg/kg			
		シスプラチン	シスプラチン注	60 mg/m2	点滴静注	day1	
		S-1	エスワンタイホウ配合OD錠	80-120 mg/body	経口	day1-14	
胃	SP(35日間)+ハーセプチン	トラスツズマブ　（初回）	ハーセプチン注	8 mg/kg	点滴静注	day1	21日間
		（2回目以降）		6 mg/kg			
		シスプラチン	シスプラチン注	60 mg/m2	点滴静注	day8	35日間
		S-1	エスワンタイホウ配合OD錠	80-120 mg/body	経口	day1-21	
胃	ハーセプチン+XP	トラスツズマブ　（初回）	ハーセプチン注	8 mg/kg	点滴静注	day1	21日間
		（2回目以降）		6 mg/kg			
		シスプラチン	シスプラチン注	80 mg/m2	点滴静注	day1	
		カペシタビン	カペシタビン錠	2000 mg/m2	経口	day1夕-day15朝	

適用	レジメン名称	薬剤名称	商品名	投与量	投与経路	投与日	1コースの期間
胃・大腸	mFOLFOX6	オキサリプラチン	オキサリプラチン注	85 mg/m2	点滴静注	day1	14日間
		レボホリナート	レボホリナート注	200 mg/m2	点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	400 mg/m2	急速点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	2400 mg/m2	点滴静注	day1(46H)	
大腸	mFOLFOX6 ＋セツキシマブ(biweekly)	セツキシマブ	アービタックス注	500 mg/m2	点滴静注	day1	14日間
		オキサリプラチン	オキサリプラチン注	85 mg/m2	点滴静注	day1	
		レボホリナート	レボホリナート注	200 mg/m2	点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	400 mg/m2	急速点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	2400 mg/m2	点滴静注	day1(46H)	
大腸	mFOLFOX6＋ベバシズマブ	ベバシズマブ	ベバシズマブBS注	5 mg/kg	点滴静注	day1	14日間
		オキサリプラチン	オキサリプラチン注	85 mg/m2	点滴静注	day1	
		レボホリナート	レボホリナート注	200 mg/m2	点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	400 mg/m2	急速点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	2400 mg/m2	点滴静注	day1(46H)	
大腸	mFOLFOX6＋パニツムマブ	パニツムマブ	ベクティビックス注	6 mg/kg	点滴静注	day1	14日間
		オキサリプラチン	オキサリプラチン注	85 mg/m2	点滴静注	day1	
		レボホリナート	レボホリナート注	200 mg/m2	点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	400 mg/m2	急速点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	2400 mg/m2	点滴静注	day1(46H)	
大腸	FOLFIRI	イリノテカン	イリノテカン注	150 mg/m2	点滴静注	day1	14日間
		レボホリナート	レボホリナート注	200 mg/m2	点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	400 mg/m2	急速点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	2400 mg/m2	点滴静注	day1(46H)	
大腸	FOLFIRI＋サイラムザ	ラムシルマブ	サイラムザ注	8 mg/kg	点滴静注	day1	14日間
		イリノテカン	イリノテカン注	150 mg/m2	点滴静注	day1	
		レボホリナート	レボホリナート注	200 mg/m2	点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	400 mg/m2	急速点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	2400 mg/m2	点滴静注	day1(46H)	
大腸	FOLFIRI+ザルトラップ	アフリベルセプトベータ	ザルトラップ注	4 mg/kg	点滴静注	day1	14日間
		イリノテカン	イリノテカン注	150 mg/m2	点滴静注	day1	
		レボホリナート	レボホリナート注	200 mg/m2	点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	400 mg/m2	点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	2400 mg/m2	点滴静注	day1(46H)	

適用	レジメン名称	薬剤名称	商品名	投与量	投与経路	投与日	1コースの期間
大腸	FOLFIRI ＋セツキシマブ(biweekly)	セツキシマブ	アービタックス注	500 mg/m2	点滴静注	day1	14日間
		イリノテカン	イリノテカン注	150 mg/m2	点滴静注	day1	
		レボホリナート	レボホリナート注	200 mg/m2	点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	400 mg/m2	急速点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	2400 mg/m2	点滴静注	day1(46H)	
大腸	FOLFIRI＋ベバシズマブ	ベバシズマブ	ベバシズマブBS注	5 mg/kg	点滴静注	day1	14日間
		イリノテカン	イリノテカン注	150 mg/m2	点滴静注	day1	
		レボホリナート	レボホリナート注	200 mg/m2	点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	400 mg/m2	急速点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	2400 mg/m2	点滴静注	day1(46H)	
大腸	FOLFIRI＋パニツムマブ	パニツムマブ	ベクティビックス注	6 mg/kg	点滴静注	day1	14日間
		イリノテカン	イリノテカン注	150 mg/m2	点滴静注	day1	
		レボホリナート	レボホリナート注	200 mg/m2	点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	400 mg/m2	急速点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	2400 mg/m2	点滴静注	day1(46H)	
大腸	CPT-11＋セツキシマブ (biweekly)	セツキシマブ	アービタックス注	500 mg/m2	点滴静注	day1	14日間
		イリノテカン	イリノテカン注	150 mg/m2	点滴静注	day1	
大腸	CPT-11＋パニツムマブ	パニツムマブ	ベクティビックス注	6 mg/kg	点滴静注	day1	14日間
		イリノテカン	イリノテカン注	150 mg/m2	点滴静注	day1	
大腸	IRIS(3週毎)	イリノテカン	イリノテカン注	150 mg/m2	点滴静注	day1	21日間
		S-1	エスワンタイホウ配合OD錠	80 mg/m2	経口	day1-14	
大腸	IRIS+アバスチン(3週毎)	ベバシズマブ	ベバシズマブBS注	7.5 mg/kg	点滴静注	day1	21日間
		イリノテカン	イリノテカン注	150 mg/m2	点滴静注	day1	
		S-1	エスワンタイホウ配合OD錠	80-120 mg/body	経口	day1-14	
大腸	SOX	オキサリプラチン	オキサリプラチン注	130 mg/m2	点滴静注	day1	21日間
		S-1	エスワンタイホウ配合OD錠	80-120 mg/body	経口	day1-14	
大腸	SOX+アバスチン	ベバシズマブ	ベバシズマブBS注	7.5 mg/kg	点滴静注	day1	21日間
		オキサリプラチン	オキサリプラチン注	130 mg/m2	点滴静注	day1	
		S-1	エスワンタイホウ配合OD錠	80-120 mg/body	経口	day1-14	
大腸	TAS-102+ベバシズマブ	ベバシズマブ	ベバシズマブBS注	5 mg/kg	点滴静注	day1,15	28日間
		TAS-102（ロンサーフ）	ロンサーフ配合錠	70 mg/m2	経口	day1夕-day6朝	
						day8夕-day13朝	

適用	レジメン名称	薬剤名称	商品名	投与量	投与経路	投与日	1コースの期間
大腸	UFT/UZEL+ベバシズマブ	ベバシズマブ	ベバシズマブBS注	5 mg/kg	点滴静注	day1,15	28日間
		UFT	ユーエフティE配合顆粒	300 mg/m2	経口	day1-21	
		ユーゼル	ユーゼル錠	75 mg/body	経口	day1-21	
大腸	XELIRI	イリノテカン	イリノテカン注	200 mg/m2	点滴静注	day1	21日間
		カペシタビン	カペシタビン錠	1600 mg/m2	経口	day1夕-day15朝	
大腸	XELIRI+アバスチン(3週毎)	ベバシズマブ	ベバシズマブBS注	7.5 mg/kg	点滴静注	day1	21日間
		イリノテカン	イリノテカン注	200 mg/m2	点滴静注	day1	
		カペシタビン	カペシタビン錠	1600 mg/m2	経口	day1夕-day15朝	
大腸	ＸＥＬＯＸ	オキサリプラチン	オキサリプラチン注	130 mg/m2	点滴静注	day1	21日間
		カペシタビン	カペシタビン錠	2000 mg/m2	経口	day1夕-day15朝	
大腸	ＸＥＬＯＸ+アバスチン	ベバシズマブ	ベバシズマブBS注	7.5 mg/kg	点滴静注	day1	21日間
		オキサリプラチン	オキサリプラチン注	130 mg/m2	点滴静注	day1	
		カペシタビン	カペシタビン錠	2000 mg/m2	経口	day1夕-day15朝	
大腸	セツキシマブ(biweekly)	セツキシマブ	アービタックス注	500 mg/m2	点滴静注	day1	14日間
大腸	ゼローダ+アバスチン	ベバシズマブ	ベバシズマブBS注	7.5 mg/kg	点滴静注	day1	21日間
		カペシタビン	カペシタビン錠	1200- 2100 mg/body	経口	day1-14	
大腸	ハーセプチン＋パージェタ	ペルツズマブ　（初回）	パージェタ注	840 mg/body	点滴静注	day1	21日間
		（2回目以降）		420 mg/body			
		トラスツズマブ　（初回）	ハーセプチン注	8 mg/kg	点滴静注	day1	
		（2回目以降）		6 mg/kg			
大腸	フェスゴ(HER+PER)	ペルツズマブ トラスツズマブ	フェスゴ注IN	1200 mg/body 600 mg/body	皮下注	初回day1	21日間
		ペルツズマブ トラスツズマブ	フェスゴ注MA	600 mg/body 600 mg/body	皮下注	２回目以降day1	
大腸	パニツムマブ	パニツムマブ	ベクティビックス注	6 mg/kg	点滴静注	day1	14日間
大腸	ビラフトビ＋セツキシマブ(weekly)	セツキシマブ	アービタックス注　1週目	400 mg/m2	点滴静注	day1	7日間
			2週目～	250 mg/m2	点滴静注	day1	
		エンコラフェニブ	ビラフトビカプセル	300 mg/body	経口	day1-7	
大腸	ビラフトビ＋セツキシマブ(biweekly)	セツキシマブ	アービタックス注	500 mg/m2	点滴静注	day1	14日間
		エンコラフェニブ	ビラフトビカプセル	300 mg/body	経口	day1-14	

適用	レジメン名称	薬剤名称	商品名	投与量	投与経路	投与日	1コースの期間
大腸	ビラフトビ・メクトビ・セツキシマブ(weekly)	セツキシマブ	アービタックス注　1週目	400 mg/m2	点滴静注	day1	7日間
			2週目～	250 mg/m2	点滴静注	day1	
		エンコラフェニブ	ビラフトビカプセル	300 mg/body	経口	day1-7	
		ビニメチニブ	メクトビ錠	90 mg/body	経口	day1-7	
大腸	ビラフトビ・メクトビ・セツキシマブ(biweekly)	セツキシマブ	アービタックス注	500 mg/m2	点滴静注	day1	14日間
		エンコラフェニブ	ビラフトビカプセル	300 mg/body	経口	day1-14	
		ビニメチニブ	メクトビ錠	90 mg/body	経口	day1-14	
大腸	5-FU+MMC+放射線	マイトマイシンC	マイトマイシン注	10 mg/m2	点滴静注	day1	28日間
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	800 mg/m2	点滴静注	day1-4	
膵	FOLFIRINOX	オキサリプラチン	オキサリプラチン注	85 mg/m2	点滴静注	day1	14日間
		イリノテカン	イリノテカン注	180 mg/m2	点滴静注	day1	
		レボホリナート	レボホリナート注	200 mg/m2	点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	400 mg/m2	急速点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	2400 mg/m2	点滴静注	day1(46H)	
膵	GEM単独	ゲムシタビン	ゲムシタビン注	1000 mg/m2	点滴静注	day1,8,15	28日間
膵	GEM（２投１休）	ゲムシタビン	ゲムシタビン注	1000 mg/m2	点滴静注	day1,8	21日間
膵	GEM＋nab-PTX	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	アブラキサン注	125 mg/m2	点滴静注	day1,8,15	28日間
		ゲムシタビン	ゲムシタビン注	1000 mg/m2	点滴静注	day1,8,15	
膵	GS	ゲムシタビン	ゲムシタビン注	1000 mg/m2	点滴静注	day1,8	21日間
		S-1	エスワンタイホウ配合OD錠	80-120 mg/body	経口	day1-14	
膵	nal-IRI+5-FU/LV	イリノテカンリポソーム製剤	オニバイド注	70 mg/m2	点滴静注	day1	14日間
		レボホリナート	レボホリナート注	200 mg/m2	点滴静注	day1	
		フルオロウラシル	フルオロウラシル注	2400 mg/m2	点滴静注	day1(46H)	
胆道	イミフィンジ＋GS	デュルバルマブ	イミフィンジ注	1500 mg/body	点滴静注	day1	1-8コース：21日間 9コース～：28日間
		シスプラチン	シスプラチン注	25 mg/m2	点滴静注	1-8コース　day1,8	
		ゲムシタビン	ゲムシタビン注	1000 mg/m2	点滴静注	1-8コース　day1,8	
胆道	ゲムシタビン・シスプラチン・S-1	シスプラチン	シスプラチン注	25 mg/m2	点滴静注	day1	14日間
		ゲムシタビン	ゲムシタビン注	1000 mg/m2	点滴静注	day1	
		S-1	エスワンタイホウ配合OD錠	60-120 mg/body	経口	day1-7	

【外科（消化器外科、乳腺外科）】

適用	レジメン名称	薬剤名称	商品名	投与量	投与経路	投与日	1コースの期間
胆道	GEM+CDDP	ゲムシタビン	ゲムシタビン注	1000 mg/m2	点滴静注	day1,8	21日間
		シスプラチン	シスプラチン注	25 mg/m2	点滴静注	day1,8	
胆道	S-1/GEM	ゲムシタビン	ゲムシタビン注	1000 mg/m2	点滴静注	day1,8	21日間
		S-1	エスワンタイホウ配合OD錠	60 mg/m2	経口	day1-14	
肝	テセントリク・アバスチン	アテゾリズマブ	テセントリク注	1200 mg/body	点滴静注	day1	21日間
		ベバシズマブ	アバスチン注	15 mg/kg	点滴静注	day1	
肝	デュルバルマブ単独	デュルバルマブ	イミフィンジ注	1500 mg/body	点滴静注	day1	28日間
肝	デュルバルマブ・トレメリムマブ	トレメリムマブ	イジュド注	300 mg/body	点滴静注	1コース目のみ：day1	28日間
		デュルバルマブ	イミフィンジ注	1500 mg/body	点滴静注	day1	
MSI-High 固形癌	キイトルーダ200(3週間)	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	200 mg/body	点滴静注	day1	21日間
MSI-High 固形癌	キイトルーダ400(6週間)	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	400 mg/body	点滴静注	day1	42日間
神経内分泌	CBDCA+VP-16	カルボプラチン	カルボプラチン注	5 AUC	点滴静注	day1	21日間
		エトポシド	エトポシド注	100 mg/m2	点滴静注	day1-3	
神経内分泌	イリノテカン＋シスプラチン	イリノテカン	イリノテカン注	60 mg/m2	点滴静注	day1,8,15	28日間
		シスプラチン	シスプラチン注	60 mg/m2	点滴静注	day1	
神経内分泌	アムルビシン	アムルビシン	カルセド注	45 mg/m2	静注	day1-3	21日間

適用	レジメン名称	薬剤名称	商品名	投与量	投与経路	投与日	1コースの期間
乳腺	ddAC	ドキソルビシン	ドキソルビシン注	60 mg/m2	急速点滴静注	day1	14日間
		シクロホスファミド	エンドキサン注	600 mg/m2	点滴静注	day1	
乳腺	ddDTX	ドセタキセル	ドセタキセル注	75 mg/m2	点滴静注	day1	14日間
乳腺	ddEC	エピルビシン	エピルビシン塩酸塩注	90 mg/m2	急速点滴静注	day1	14日間
		シクロホスファミド	エンドキサン注	600 mg/m2	点滴静注	day1	
乳腺	ddPTX	パクリタキセル	パクリタキセル注	175 mg/m2	点滴静注	day1	14日間
乳腺	EC	エピルビシン	エピルビシン塩酸塩注	90 mg/m2	点滴静注	day1	21日間
		シクロホスファミド	エンドキサン注	600 mg/m2	点滴静注	day1	
乳腺	キイトルーダ+EC(3週間毎)	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	200 mg/body	点滴静注	day1	21日間
		エピルビシン	エピルビシン塩酸塩注	90 mg/m2	点滴静注	day1	
		シクロホスファミド	エンドキサン注	600 mg/m2	点滴静注	day1	
乳腺	GEM	ゲムシタビン	ゲムシタビン注	1250 mg/m2	点滴静注	day1,8	21日間
乳腺	TC	ドセタキセル	ドセタキセル注	75 mg/m2	点滴静注	day1	21日間
		シクロホスファミド	エンドキサン注	600 mg/m2	点滴静注	day1	
乳腺	アブラキサン 3weeks	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	アブラキサン注	260 mg/m2	点滴静注	day1	21日間
乳腺	アブラキサンweekly +アバスチン	ベバシズマブ	ベバシズマブBS注	10 mg/kg	点滴静注	day1,15	28日間
		パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	アブラキサン注	100 mg/m2	点滴静注	day1,8,15	
乳腺	エンハーツ	トラスツズマブ　デルクステカン	エンハーツ注	5.4 mg/kg	点滴静注	day1	21日間
乳腺	カドサイラ	トラスツズマブ　エムタンシン	カドサイラ注	3.6 mg/kg	点滴静注	day1	21日間
乳腺	キイトルーダ200(3週間)	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	200 mg/body	点滴静注	day1	21日間
乳腺	キイトルーダ400(6週間)	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	400 mg/body	点滴静注	day1	42日間
乳腺	キイトルーダ+パクリ+カルボ（毎週）	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	200 mg/body	点滴静注	day1	21日間
		パクリタキセル	パクリタキセル注	80 mg/m2	点滴静注	day1,8,15	
		カルボプラチン	カルボプラチン注	1.5 AUC	点滴静注	day1,8,15	
乳腺	キイトルーダ+パクリ+カルボ（３週間）	ペムブロリズマブ	キイトルーダ注	200 mg/body	点滴静注	day1	21日間
		パクリタキセル	パクリタキセル注	80 mg/m2	点滴静注	day1,8,15	
		カルボプラチン	カルボプラチン注	5 AUC	点滴静注	day1	
乳腺	ゲムシタビン＋カルボプラチン	ゲムシタビン	ゲムシタビン注	1000 mg/m2	点滴静注	day1.8	21日間
		カルボプラチン	カルボプラチン注	2 AUC	点滴静注	day1,8	

【外科（消化器外科、乳腺外科）】

適用	レジメン名称	薬剤名称	商品名	投与量	投与経路	投与日	１コースの期間
乳腺	ダトロウェイ	ダトポタマブ　デルクステカン	ダトロウェイ注	6 mg/kg	点滴静注	day1	21日間
乳腺	ドセタキセル	ドセタキセル	ドセタキセル注	75 mg/m2	点滴静注	day1	21日間
乳腺	ドセタキセル＋カルボプラチン	ドセタキセル	ドセタキセル注	75 mg/m2	点滴静注	day1	21日間
		カルボプラチン	カルボプラチン注	6 AUC	点滴静注	day1	
乳腺	トロデルビ	サシツズマブゴビテカン	トロデルビ注	10 mg/kg	点滴静注	day1,8	21日間
乳腺	パクリタキセル＋アバスチン	ベバシズマブ	ベバシズマブBS注	10 mg/kg	点滴静注	day1,15	28日間
		パクリタキセル	パクリタキセル注	90 mg/m2	点滴静注	day1,8,15	
乳腺	ハーセプチン	トラスツズマブ　（初回）	ハーセプチン注	8 mg/kg	点滴静注	day1	21日間
		（2回目以降）		6 mg/kg			
乳腺	パージェタ＋ハーセプチン	ペルツズマブ　（初回）	パージェタ注	840 mg/body	点滴静注	day1	21日間
		（2回目以降）		420 mg/body			
		トラスツズマブ　（初回）	ハーセプチン注	8 mg/kg	点滴静注	day1	
		（2回目以降）		6 mg/kg			
乳腺	フェスゴ(HER+PER)	ペルツズマブ トラスツズマブ	フェスゴ注IN	1200 mg/body 600 mg/body	皮下注	初回day1	21日間
		ペルツズマブ トラスツズマブ	フェスゴ注MA	600 mg/body 600 mg/body	皮下注	２回目以降day1	
乳腺	ハラヴェン単独	エリブリン	ハラヴェン注	1.4 mg/m2	点滴静注	day1,8	21日間
乳腺	ビノレルビン	ビノレルビン	ナベルビン注	25 mg/m2	点滴静注	day1,8	21日間